




โรคซิฟิลิส (SYPHILIS)



เกิดจาก



การติดเชื้อแบคทีเรีย
Treponema Pallidum
จากการสัมผัสถูกเชื้อโดยตรง
จากแผลหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
มักพบการติดเชื้อจากการมี
เพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
ซิฟิลิส หากเป็นการติดเชื้อแรกเริ่ม
จะสามารถรักษาให้หายขาดได้



โรคซิฟิลิส แบ่งเป็น 3 ระยะ

ซิฟิลิสระยะที่ 1 (PRIMARY SYPHILIS)

- ผู้ป่วยมีแผลบริเวณอวัยวะเพศ หรืออวัยวะอื่นที่มีเพศสัมพันธ์ เช่น ปาก ทวารหนัก
- ลักษณะเป็นแผลขอบแข็ง ไม่เจ็บ บริเวณก้นแผลแข็ง คล้ายกระดูก
- แผลสามารถหายภายใน 6 สัปดาห์แม้ไม่ได้รับการรักษา

ซิฟิลิสระยะที่ 2 (SECONDARY SYPHILIS)

- ผู้ป่วยมีผื่น อาจพบได้ทั่วตัว มักพบที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
- ลักษณะผื่นส่วนใหญ่จะแดงนูน มีสะเก็ด ไม่คัน
- สามารถหายได้เองภายในไม่กี่สัปดาห์ แต่สามารถเป็นใหม่ได้อีกครั้ง

ซิฟิลิสระยะที่ 3 (LATE BENIGN GUMMATOUS SYPHILIS)

- ซิฟิลิสระบบหัวใจและหลอดเลือด
(Cardiovascular syphilis)



ทั้งนี้ยังมีซิฟิลิสระยะแฝง (Latent syphilis)

ภาวะแทรกซ้อน



- หากผู้ป่วยไม่รักษาโรคอย่างต่อเนื่องให้หายขาด อาการจะรุนแรงขึ้น เช่น อัมพาต โรคหัวใจ ตาบอด ภาวะสมองเสื่อม ไร้สมรรถภาพทางเพศ เสียสติ หูหนวก และอาจเสียชีวิตได้
- ในสตรีมีครรภ์อาจมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรหรือทารกเสียชีวิตแรกคลอด การก่อมีภาวะโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด ทำให้เกิดความผิดปกติ เช่น กระดูก ดวงตา ฟัน สมอ การได้ยิน

