

ชื่อเรื่องวิจัย อัตราอุบัติการณ์การเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อมทอนซิล

สาขา หู คอ จมูก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ชื่อผู้วิจัย นางมณฑิรา ยวนิชยากุล

บทคัดย่อ

การผ่าตัดทอนซิลเป็นวิธีการรักษาหนึ่งที่พบมาก ในสาขา หู คอ จมูก ซึ่งภาวะเลือดออกเพียงเล็กน้อยหลังการผ่าตัดต่อมทอนซิลเป็นภาวะที่มักพบโดยทั่วไป แต่การเสียเลือดในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอันตรายหากการดูแลตามมาตรฐานทางการแพทย์เบื้องต้นไม่สามารถหยุดเลือดได้ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหรือให้การรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราอุบัติการณ์การเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อมทอนซิลภายใน 24 ชั่วโมง และภายใน 7 วัน และศึกษาข้อมูลการพยาบาลในการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด และการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด เป็นการศึกษาโดยการบันทึก ติดตามจากผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทอนซิลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 จำนวน 48 ราย จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.1 มี อายุระหว่าง 3-7 ปี มากที่สุด ร้อยละ 31.3 มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด คือต่อมทอนซิลอักเสบร่วมกับการนอนกรนร้อยละ 54.2 หลังผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมง มีภาวะเลือดออกเล็กน้อย 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.2 และอาการหายไปภายใน 30 นาที ส่วนภาวะเลือดออกภายใน 7 วัน พบ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.08 ซึ่งเป็นภาวะเลือดออกรุนแรง เกรด 4 เป็นชายอายุ 31 ปี ต้องได้รับการผ่าตัดซ้ำเพื่อหยุดเลือดหลังผ่าตัดได้รับการสังเกตอาการจนครบ 24 ชั่วโมง ไม่พบอาการผิดปกติ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน จากการซักประวัติ และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียเลือดเกิดจากผู้ป่วยมีประวัติดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ซึ่งแอลกอฮอล์อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกร็ดเลือดมีการทำงานผิดปกติได้ ทำให้เกิดภาวะเลือดออกหลังผ่าตัด